November, 1975

## 四川为害油桐的角蝉科两新种

周 尧 (西北农学院)

四川省油桐产区(万县、峨眉等县)的油桐,受到二种角蝉严重加害嫩枝、果柄及果实,影响桐油生产。

## 中华高冠角蝉 Hypsauchenia chinensis Chou 新种

大型的种,身体(图 1:1) 背面黑褐色到黑色,多点刻,有黄色的细毛;腹面黑色。颜黑色,长阔略相等(图 1:2); 唇基黑褐色,呈三瓣状。眼黑色,突出。单眼明显,单眼间的距离约为单眼与复眼间距离的两倍,位置和复眼上缘在同一水平线上。

前胸背板黑褐色,接近黑色,脊线黄褐色。前胸斜面(图 1:3) 三角形,肩角钝而明显;前角细长,略呈圆柱形,有五条纵的脊线,三条在前面,二条在后面;前角到达一定高度向后作弓状弯曲,端部分为二支,每支末端扩展成扁平的心脏形的瓣,有一部分互相重叠(图 1:4)。后突起成扁三稜形,背面有一条脊线;亚端结侧扁,高起呈三角形;末端尖锐,到达覆翅的后角。所有脊线上都有小齿。




图 1 中华高冠角蝉 Hypsauchenia chinensis Chou, sp. nov.

- 1.整体,侧面观; 2.头的正面(特别放大); 3.头和前胸斜面,前面观; 4.前胸前角末端的瓣;
- 5. 覆翅; 6. 后翅; 7. 雄性腹部末节; 8. 雌性腹部末节

覆翅(图 1:5) 黑褐色, 革区近中部、爪区的中部和端部各有白色斑点; 翅狭长, 顶角尖锐, 外缘平直。后翅(图 1:6) 透明, 顶角与外缘烟煤色, 脉纹黑褐色。

足黄褐色,腿节及爪黑褐色。

腹部各节黑色,后缘黑褐色。雄性生殖器见图 1:7, 雌性生殖器见图 1:8。

体长从头的前面到覆翅末端为9毫米。两肩角间的宽度约2.5毫米。从前胸腹板的 底面到前角顶端的高度约7毫米。

模式标本 正模:  $1\,\circ$ ; 配模:  $1\,\circ$ ; 副模:  $1\,\circ$ , 1964 年 3 月张务民同志采自四川万县;  $3\,\circ$ ,  $3\,\circ$ , (及大量幼虫与卵块) 1974 年 7 月 22 日袁锋同志采自四川峨眉山(标本保存在西北农学院植保系昆虫标本室);  $2\,\circ$ ,  $2\,\circ$ , 四川峨眉山, 1957 年 7 月 4—23 日李佑才采(标本存北京动物研究所);  $3\,\circ$ , 贵州湄潭, 1951 年 7 月 26 日, 8 月 29 日李富江采(标本存华北农业大学)。

被害植物 油桐。成虫及若虫普遍加害嫩枝、果柄及果实。卵产在嫩枝及果柄上,将植物表皮纵裂,每处产卵 50—100 个,排列成卵形盘状,若虫群集为害。受害果实干缩,不能发育。

**附志** 本种相似于 *H. hardwickii* Kirby, 但体型较大, 颜色较深, 覆翅上具有白色的 斑点, 前胸背板后突起的亚端结成三角形。

## 油桐三刺角蝉 Tricentrus aleuritis Chou 新种

大型的种(图 2:1)体粗壮, 黄褐色到黑色, 多点刻, 有很密的黄褐色的细毛。 头(图 2:2)黄褐色或黑色, 宽为高的两倍, 有微小的点刻和密的细毛。 眼大, 半球形,




图 2 油桐三刺角蝉 Tricentrus aleuritis Chou, sp. nov.

- 1. 整体,侧面观; 2. 头的正面(特别放大); 3. 头和前胸斜面,前面观; 4. 前胸,背面观;
- 5. 覆翅; 6. 后翅; 7. 雄性腹部末节; 8. 雌性腹部末节

上缘圆形,下缘平直。单眼大而明显,单眼间的距离与单眼到复眼的距离相等。唇基分为三瓣,侧瓣很小,中瓣大,端部截形。

前胸背板(图 2:4) 黄褐色或黑色,有很多密的细毛。前胸斜面(图 2:3) 有很多细的点刻及一条中脊线。肩角小,但明显。上肩角极阔,背腹扁平,边缘锐利而端部略尖,其长度超过基部的宽度,伸向侧上方而微微向后弯曲。后突起呈扁平的三棱形,中脊线明显,末端尖锐,超过覆翅的肛角。背面的点刻较粗。小盾片露出。

覆翅(图 2:5) 短阔,顶角明显,但不尖。 其基部八分之一黑色,外侧有一白色透明的狭的横带,在二分之一处又有一白色透明的横带,其内侧与外侧各有一暗褐的横带,顶角暗褐色。脉纹黄褐色,在暗褐横带中黑色。后翅透明白色,多皱纹(图 2:6)。

足的基节、腿节及爪黑色,胫节及跗节黄褐色。

腹部各节黑色。雄性生殖器见图 2:7。雌性生殖器见图 2:8。

体长(到覆翅末端) 6.5—7毫米。上肩角间的宽度♂3毫米,♀4毫米。 最大高度 4毫米。

模式标本 正模:  $1\,\circ$ ; 配模:  $1\,\circ$ ; 副模:  $1\,\circ$ ,  $3\,\circ$ ; 1964 年 5 月张务民同志采自四 川万县(标本均保存在西北农学院植物保护系昆虫标本室)。

被害植物 油桐(普遍加害嫩枝)。

**附志** 本种相似于 *T. fuscoapicalis* Kato, 但覆翅有明显的二条白色透明的横带和二条暗褐色横带。